

Calendário de vacinação | Rede pública<sup>7</sup>

(MAT-BR-2103800)

Vacina	Esquema Básico	Reforço	Idade recomendada	Intervalo recomendado entre doses	Intervalo mínimo entre doses
<b>BCG</b>	Dose única	-	Ao nascer	-	-
<b>Hepatite B</b>	Uma dose ao nascer	-	Ao nascer	-	-
<b>Poliomielite (tipo 1, 2 e 3)</b>	3 doses	2 reforços com a vacina VOP	2 meses, 4 meses e 6 meses	60 dias	30 dias
<b>Poliomielite (tipo 1 e 3)</b>	-	2 doses de reforço		-	1º ref. 6 meses após 3ª dose da VIP, 2º ref. 6 meses após 1º ref.
<b>Rotavírus</b>	2 doses	-	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses	60 dias	30 dias
<b>DTP + Hib + HB (Penta)</b>	3 doses	2 reforços com a vacina DTP	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses 3ª dose: 6 meses	60 dias	30 dias
<b>Pneumocócica 10 valente</b>	2 doses	Reforço	1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 meses 3ª dose: 12 meses	60 dias	30 dias da 1ª para 2ª dose e de 60 dias da 2ª dose para o reforço.
<b>Meningocócica</b>	2 doses	1º reforço	1ª dose: 3 meses 2ª dose: 5 meses 3ª dose: 12 meses	60 dias	30 dias da 1ª para 2ª dose e de 60 dias da 2ª dose para o 1º reforço.
<b>Febre Amarela</b>		Reforço	Dose: 9 meses Reforço: 4 anos de idade	-	30 dias
<b>Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR)</b>		-	12 meses	-	30 dias

Vacina	Esquema Básico	Reforço	Idade recomendada	Intervalo recomendado entre doses	Intervalo mínimo entre doses
<b>Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCRV)</b>	1 dose (corresponde a segunda dose da SCR e primeira de varicela)	-	15 meses	-	-
<b>Hepatite A</b>	1 dose	-	15 meses	-	-
<b>Difteria, Tétano, Pertussis</b>	Considerar doses anteriores (3 doses)	2 reforços	1º reforço: 15 meses após 3ª dose. 2º reforço: 4 anos de idade	1º ref. 9 meses após 3ª dose. 2º ref. 3 anos após 1º ref.	1º ref. 6 meses após 3ª dose, 2º ref. 6 meses após 1º ref.
<b>Difteria, Tétano</b>	3 doses considerar doses anteriores com penta e DTP	A cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves a cada 5 anos.	A partir dos 7 anos		30 dias
<b>HPV</b>	2 doses	-	De 9 a 14 anos para meninas De 11 a 14 anos para meninos	2ª dose: 6 meses após 1ª dose.	2ª dose: 6 meses após 1ª dose.
<b>Pneumocócica 23-valente</b>	1 dose	Uma dose a depender da situação vacinal anterior com a PNM10v	A partir de 5 anos para povos indígenas		-
<b>Varicela</b>	1 dose (corresponde a segunda dose de varicela)	-	4 anos	-	30 dias
<b>Influenza</b>	1 dose ou duas doses	Dose anual	6 meses a menores de 6 anos	-	-

Referência: Ministério da Saúde. Calendário Nacional de Vacinação (PNI). Disponível em: <https://www.saude.gov.br/files/imunizacao/calendario/Calendario.Nacional.Vacinacao.20.20.atualizado.pdf>. Acesso em 23/06/2021