



vacinação sem dúvida

SANOFI PASTEUR

Calendário de vacinação | Criança³ Dos 2 aos 9 anos de idade


VACINAS	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos
Tríplice bacteriana		Reforço			
Poliomielite Inativado		Reforço			
Meningocócica B			Reforço		
Gripe	Dose anual com duas doses antes dos 9 anos				
Febre amarela		2ª dose			
HPV4					Duas doses
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto					Reforço
Dengue					Três doses para soropositivos

#JuntosProtegemosAVida



(MAT-BR-2103800)

A C



Tríplice bacteriana: o uso da vacina DTPa (só com as proteínas da bactéria) é preferível ao da DTPw (com células inteiras da bactéria), pois as reações adversas são menos frequentes e intensas. Poliomielite: recomenda-se que, idealmente, todas as doses sejam com a VIP (injeção com o vírus inativado). Não utilizar VOP (via oral e com o vírus enfraquecido) em crianças hospitalizadas e imunodeficientes.

Meningocócica B: A partir dos 24 meses de idade: duas doses com intervalo mínimo de um mês entre elas e não estabelecida a necessidade de doses de reforço. Recomenda-se uma dose de reforço um ano após o fim do esquema de doses básico para cada faixa etária e revacinar a cada três anos grupos de alto risco: portadores de asplenia anatômica ou funcional, deficiência de complemento ou pessoas em uso de biológicos que interferem na via do complemento.

Gripe: é recomendada para todas as crianças a partir dos 6 meses de idade. Quando administrada pela primeira vez em crianças menores de 9 anos, aplicar duas doses com intervalo de 30 dias. Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, por ter maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V.

Febre amarela: a segunda dose da vacina ocorre aos 4 anos de idade. Contraindicada para imunodeprimidos, mas se o risco de adquirir a doença superar os riscos potenciais da vacinação, o médico deve avaliar seu uso (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais). Essa vacina pode ser exigida para maiores de 9 meses de vida para emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.

HPV4: O esquema de vacinação para meninas e meninos menores de 15 anos é de duas doses com intervalo de 6 meses (0 - 6 meses).

Tríplice bacteriana: o uso da vacina DTPa (só com as proteínas da bactéria) é preferível ao da DTPw (com células inteiras da bactéria), pois as reações adversas são menos frequentes e intensas.
Dengue: recomendada para crianças soropositivas (pessoa previamente exposta ao vírus da dengue. A infecção prévia por dengue pode ser avaliada por um histórico médico de dengue confirmada em teste de laboratório ou soroteste). Esquema de três doses com intervalo de seis meses entre elas (0 - 6 - 12 meses). Contraindicada para crianças soronegativas e imunodeprimidas.