vacinação sem dúvida | SANOFI PASTEUR

## Calendário de vacinação | Adolescentes[4] 10 aos 19 anos

| VACINAS | Esquemas e recomendações | Comentários |
|---|---|---|
| **Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)** | Duas doses da vacina acima de 1 ano de idade, com intervalo mínimo de um mês entre elas. Para adolescentes com esquema completo, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo. | |
| **Hepatites A, B ou A e B** | **Hepatite A:** duas doses, no esquema 0 - 6 meses.<br>**Hepatite B:** três doses, esquema 0 - 1 - 6 meses.<br>**Hepatite A e B:** para menores de 16 anos: duas doses aos 0 - 6 meses.<br>**A partir de 16 anos:** três doses aos 0 - 1 - 6 meses. | |
| **HPV4** | Se o esquema de vacinação não foi iniciado aos 9 anos, aplicar a vacina o mais precocemente possível. O esquema de vacinação para meninas e meninos menores de 15 anos é de duas doses com intervalo de seis meses (0 - 6 meses). Para adolescentes com idade ≥ 15 anos, não imunizados anteriormente, o esquema é de três doses (0 - 1 a 2 - 6 meses). | |
| **Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétan e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP** | Com esquema de vacinação completo, incluindo a dose dos 9-10 anos: dose de reforço, preferencialmente com dTpa, dez anos após a última.<br>Com esquema de vacinação incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico.<br>Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose dedTpa e duas doses de dT no esquema 0 - 2 - 4 a 8 meses. | |
| **Catapora** | **Para suscetíveis:** duas doses.<br>**Para menores de 13 anos:** intervalo de três meses.<br>**A partir de 13 anos:** intervalo de um a dois meses. | |
| **Gripe** | **Dose única anual.** | Desde que disponível, a vacina Influenza Quadrivalente é preferível à vacina Influenza Trivalente, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina Quadrivalente, utilizar a vacina Trivalente. |
| **Meningocócicas conjugadas ACWY/C** | **Para não vacinados:** duas doses com intervalo de cinco anos.<br>**Para vacinados na infância:** reforço aos 11 anos ou cinco anos após a última dose. | |
| **Meningocócica B** | Duas doses com intervalo de um a dois meses. Não se conhece a duração da proteção conferida e, consequentemente, a necessidade de dose(s) de reforço como rotina. | |
| **Febre amarela** | Dose única. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada, em especial para aqueles vacinados antes dos 2 anos de idade, pela maior possibilidade de falha vacinal primária. | |
| **Dengue*** | Recomendada apenas para adolescentes soropositivos. Esquema de três doses com intervalo de seis meses (0 - 6 - 12 meses). | |

Referência: 4. Sociedade Brasileira de Imunização. Calendário de Vacinação - Adolescentes. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-adolescente.pdf>. Acesso em: 17/05/21




(MAT-BR-2103800)

***Dengue:** recomendada para adolescentes soropositivos (pessoa previamente exposta ao vírus da dengue. A infecção prévia por dengue pode ser avaliada por um histórico médico de dengue confirmada em teste de laboratório ou soroteste).